

Les milieux le fond de vallée humide

|| Cordulégastre annelé, espèce protégée en Île-de-France




Le fond de vallée du Sausseron est composé d'une mosaïque d'habitats d'intérêt patrimonial adaptés aux sols gorgés d'eau. Les zones humides, autrefois jugées improductives, ont été souvent converties en peupleraies ou drainées. Depuis le début des années 1950, ces espaces ont considérablement régressé en Île-de-France et sont considérés comme rares aujourd'hui.

Aulnaie-frênaie

Dans le lit majeur du Sausseron s'installe la forêt alluviale à aulne glutineux et frêne. L'aulnaie à hautes herbes est caractérisée par un fort engorgement en eau du sol qui permet à de nombreuses espèces de s'installer comme la laïche des marais. Lorsque l'humidité est moins importante, la végétation de sous-bois est dominée par le groseillier et le cirse des maraîchers.

|| Feuille de frêne



Roselières, magnocariçaies

Ces milieux sont des habitats composés de végétaux appelés héliophytes, c'est-à-dire des plantes se développant les pieds dans l'eau mais présentant une tige émergée. Sur les secteurs les plus humides s'installe la roselière, dominée par le roseau commun. Sur son pourtour où les sols sont moins engorgés se développe la magnocariçaie, c'est-à-dire des peuplements de grandes laïches.

Mégaphorbiaies

Les mégaphorbiaies sont des peuplements denses de plantes à fleurs hautes qui affectionnent les sols riches. La reine des prés en est une espèce caractéristique. Ces milieux s'installent généralement sur les bordures externes des zones humides.



|| Populage des marais



|| Reine des prés



|| Iris pseudacorus



|| Equisetum telmateia




|| Aulne glutineux



|| Feuille d'aulne



|| Mégaphorbiaie



|| Magnocariçaie



|| Aulnaie à hautes herbes

Comment agir ?

Ces milieux ont une tendance naturelle au boisement. Une gestion par fauche et débroussaillage permet de limiter la colonisation des arbres et arbustes et le boisement du milieu.

